

58ª Reunião da CONITEC

Data e horário: 02 de agosto de 2017 - 12h às 18h
03 de agosto de 2017 - 9h às 18h

02 de agosto de 2017

1. Assinatura da ata da 57ª Reunião da CONITEC
2. Informe do DAF sobre incorporação de apresentações de somatropina para o tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência de Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo
3. Apreciação inicial da atualização do PCDT de Doença de Crohn
4. Apreciação inicial da atualização das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Estômago
5. Informe: ampliação de uso do naproxeno para Osteoartrite de quadril e joelho
6. Apreciação inicial do tramadol para Osteoartrite de quadril e joelho
7. Apreciação inicial das Diretrizes de Artrose de Quadril
8. Apreciação inicial das Diretrizes de Artrose de Joelho
9. Apreciação inicial da ventilação mecânica invasiva domiciliar

03 de agosto de 2017

10. Apreciação inicial do ustequinumabe para o tratamento da artrite psoriática.
11. Apreciação inicial do certolizumabe para o tratamento da artrite psoriática.
12. Apreciação inicial do secuquinumabe para o tratamento da artrite psoriática.
13. Informe: desmopressina oral para Diabetes Insipido
14. Apreciação inicial da atualização do PCDT de Diabetes Insipido
15. Apreciação inicial do Neuroestimulador medular e do estimulador de nervo periférico para o tratamento de dor neuropática

16. Informações adicionais do Protocolo de Stents para Doença Arterial Coronariana - Parte I: Doença Coronariana Estável
17. Apresentação das sugestões da consulta pública dos temas:
 - a. atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos
 - b. atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para prevenção de transmissão vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais
 - c. atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Antirretroviral Pós-Exposição de Risco de Infecção ao HIV
18. Apreciação inicial da exclusão de Podofilina 100 mg/mL, de incorporação da Podofilotoxina 1,5 g/mg creme e de Imiquimode 50 g/mg creme no tratamento de verrugas anogenitais causadas pela infecção por papilomavírus (HPV)